

علوم زیستی ورزشی - تأسیت ۱۳۹۹
دوره ۱۲، شماره ۲، ص: ۷۳۳ - ۷۲۳

تاریخ دریافت: ۹۹ / ۰۲ / ۳۰
تاریخ پذیرش: ۹۹ / ۰۶ / ۱۸

تأثیر چهار هفته تمرین مقاومتی هایپوکسی بر هایپرترووفی و عملکرد عضله دوسر بازویی مردان سالم

علی مقدسی^۱ - محمد فشی^{۲*} - سجاد احمدی زاد^۳

۱. کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ۲. استادیار، گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم تندرسنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. ۳. استاد، گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم تندرسنی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

چکیده

افزایش ترشح عوامل رشدی و متابولیکی بهوسیله تمرینات هایپوکسی نشان داده شده، این در حالی است که عملکرد عضلانی به عنوان عامل اثرگذار اجرای ورزشی مورد توجه قرار نگرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ۴ هفته تمرین مقاومتی در شرایط هایپوکسی بر هایپرترووفی و عملکرد عضله دوسر بازویی مردان سالم بود. ۱۶ مرد جوان سالم بهصورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی در شرایط هایپوکسی (فشل سهمی اکسیژن ۱۳ درصد: ۸ نفر) و نورموکسی (فشل سهمی اکسیژن ۲۰ درصد: ۸ نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی برای هردو گروه به مدت ۴ هفته شامل ۳ جلسه تمرین (درصد یک تکرار بیشینه تا واماندگی، سه سیت و یک دقیقه استراحت) حرکت جلویازو ایستاده هالت در هفته با ۴۰ ساعت ریکاوری پس از تمرین انجام گرفت. قدرت بهوسیله یک تکرار بیشینه، هایپرترووفی با استفاده از معادله بورش و عملکرد عضلانی بهوسیله دستگاه آبیزوهاینیک قبل و بعد از ۴ هفته تمرین ارزیابی شد. در مقایسه دو گروه با هم تفاوت‌های آماری معناداری برای قدرت و شاخص خستگی مشاهده شد ($P \leq 0.05$). ولی دیگر عوامل شامل درصد چربی دوسر بازویی، هایپرترووفی، گشتاور مفصل آرنج در انقباض درون گرا و برون گرا، کل کار انجام گرفته عضله دوسر بازویی در انقباض درون گرا و برون گرا، نسبت فعالیت عضلات موافق به مخالف تفاوت معناداری نداشتند ($P \geq 0.05$). به نظر می‌رسد ۴ هفته تمرین مقاومتی هایپوکسی با بهبود معنادار قدرت و شاخص خستگی همراه می‌شود و این در حالی است که هایپرترووفی و شاخص‌های عملکرد عضلانی با درنظر گرفتن حجم تمرین کمتر در شرایط هایپوکسی تغییرات مشابهی را نشان دادند.

واژه‌های کلیدی

تمرینات مقاومتی، شرایط هایپوکسیک، عملکرد عضلانی، هایپرترووفی.

مقدمه

از متدالول ترین روش‌های تمرین ورزشکاران استقامتی، تمرین در ارتفاع است. اما پاسخ کوتاه‌مدت یا بلند به تمرین در ارتفاع متفاوت بوده است. در چند سال گذشته برنامه‌های تمرینی مختلف در ارتفاع به کار گرفته شده که از بین این تمرینات زندگی در سطح دریا و تمرین در ارتفاع از بقیه موارد بیشتر توصیه شده است. در این صورت تمرین ورزشکاران در شرایط هایپوکسی و ریکاوری آنها در سطح دریا انجام می‌گیرد (۱).

تمرینات مقاومتی به یکی از محبوب‌ترین روش‌های تمرین برای افزایش آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشکاران تبدیل شده است (۲). هایپرتروفی و قدرت عضلانی دو سازگاری کسب شده بر اثر تمرین مقاومتی است که بیشتر به شدت تمرینات بستگی دارد. شدت بیشتر از ۶۰ درصد یک تکرار بیشینه برای کسب سازگاری‌های هایپرتروفی و قدرت از طریق تمرین مقاومتی ضروری است (۳). سازوکارهای درگیر در تغییرات عضلانی عوامل متفاوتی را در برمی‌گیرد که از جمله می‌توان به عوامل عصبی، هورمونی، متابولیک و مکانیکی اشاره کرد (۴).

در شرایط هایپوکسی مولکول‌های اکسیژن کمتری در حجم مشخصی از هوا قرار دارد و در نتیجه اکسیژن کمتری در هوای دمی استنشاق می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد از ارتفاع ۱۵۰۰ متر به ازای هر ۱۰۰ متر افزایش ارتفاع، یک درصد اکسیژن مصرفی بیشینه کاهش می‌یابد (۵). بدنه انسان به‌منظور جبران این کاهش نسبی اکسیژن هوا واکنش‌های سازگاری از خود نشان می‌دهد. واکنش‌ها از همان ساعات اولیه رویارویی با ارتفاع شروع می‌شود، اما در بعضی افراد سازگاری کامل به هفته‌ها و ماه‌ها رویارویی و اقامت در ارتفاع نیاز دارد (۶). این کاهش بیشینه اکسیژن مصرفی سبب می‌شود بدنه برای جبران کاهش انرژی تولیدی بیشتر از سیستم گلیکولیز استفاده کند و این خود سبب تقویت سیستم گلیکولیز می‌شود. قرارگیری در معرض هایپوکسی می‌تواند موجب بهبود عملکرد بی‌هوایی شود. این بهبود می‌تواند از طریق افزایش ظرفیت بافری عضلات (۶) یا افزایش فعالیت آنزیم‌های گلیکولیتیک باشد (۷). بهبود این دو سبب افزایش فراخوانی تارهای نوع دو و افزایش میزان هیدرولیز فسفوکراتین می‌شود که به سازگاری‌های تمرینات قدرتی می‌انجامد (۸).

هایپرتروفی تا حدودی متأثر از ترشح هورمون رشد است که سبب افزایش متابولیسم در عضله خواهد شد (۱۰، ۴). همچنین گزارش شده است که هورمون رشد در پاسخ به هر دو محرك تمرین و ارتفاع افزایش می‌یابد (۱۱). به علاوه در شرایط هایپوکسی تولید لاکتات به‌دلیل افزایش تکیه بر سوخت بی‌هوایی،

افزایش می‌یابد. غلظت بالای لاكتات در شرایط هایپوکسی نیز سبب ترشح بیشتر عوامل رشدی از جمله هورمون‌های رشد و تستوسترون می‌شود (۱۲، ۱۳). دیگر نظریه‌ها در این زمینه هایپرترووفی عضلاتی را به تولید هورمون‌های سیستمیک نسبت داده‌اند که از تغییر متابولیت‌های عضله آغاز می‌شود. این تغییر با افزایش ترشح هورمون رشد شبه‌انسولینی (IGF-1)، تستوسترون و هورمون رشد در نهایت به افزایش سنتز پروتئین و سطح مقطع عضله منجر می‌شود (۱۴، ۱۵). در پاره‌ای مطالعات، قدرت و هایپرترووفی یا پاسخ‌های هورمونی در شرایط هایپوکسی بررسی شده است (۱۶-۱۸). با وجود این عوامل تأثیرگذار هایپوکسی بر عملکرد عضلاتی آیزوکینتیک بهندرت بررسی شده است. نیشی مورا و همکاران (۲۰۱۰) برای اولین بار اثر مثبت تمرینات مقاومتی هایپوکسی را بر هایپرترووفی و قدرت نشان دادند (۱۶). کروب و همکاران (۲۰۱۴) نیز افزایش هایپرترووفی عضلاتی را در نتیجه تمرینات مقاومتی هایپوکسی گزارش کردند (۱۷). این در حالی است که پیشرفت قدرت و هایپرترووفی احتمالاً با بهبود عملکرد عضلاتی همراه است. عملکرد عضلاتی به قدرت و هایپرترووفی وابسته است و تحت تأثیر تمرینات مقاومتی قرار می‌گیرد (۱۹). بنابراین، هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ۴ هفته تمرین مقاومتی در شرایط هایپوکسی بر هایپرترووفی و عملکرد عضله دوسر بازویی مردان سالم بود.

روش تحقیق

این تحقیق به صورت نیمه‌تجربی است که به مقایسه عملکرد عضلاتی در دو گروه تمرین مقاومتی در شرایط طبیعی (نورموکسی) و تمرین مقاومتی در شرایط هایپوکسی پرداخته است. تعداد ۱۶ مرد جوان سالم (سن $۲۴/۳۵\pm۴/۱۴$ سال، شاخص توده بدن $۲۵/۴۰\pm۰/۸۱$ کیلوگرم بر مترمربع) به صورت تصادفی در دو گروه ۸ نفری گروه هایپوکسی (вшار سهمی اکسیژن ۱۳ درصد؛ ارتفاع ۴۰۰۰ متری) و نورموکسی (вшار سهمی اکسیژن ۱۸ درصد؛ ارتفاع سطح دریا) قرار گرفتند. شرایط ورود به مطالعه вшار اکسیژن خون ۹۸ میلی‌متر جیوه، نداشتن بیماری‌های تنفسی و کم‌خونی و آسیب جسمانی بود. پروتکل تمرین به مدت ۴ هفته شامل تمرین مقاومتی دوسر بازو در شرایط هایپوکسی (۸ نفر) و تمرین مقاومتی دوسر بازو در شرایط نورموکسی (۸ نفر) با تواتر ۳ جلسه در هفته بود. از آنجا که هدف از انجام تمرینات مقاومتی هایپوکسیک کوتاه کردن سازگاری‌های تمرین مقاومتی است و در مطالعات گذشته اثر مفید ۳ هفته هایپوکسی بر روی قدرت عضلاتی گزارش شده است، ۴ هفته پروتکل تمرینی برای تحقیق حاضر برنامه‌ریزی شد (۱۸). آزمودنی‌ها پس از مطالعه کامل روش مطالعه و امضای رضایت‌نامه وارد تحقیق

شدند. آزمودنی‌ها برای خروج از مطالعه در هر مرحله آزاد بودند. تمام مراحل تحقیق توسط کمیته اخلاق دانشگاه شهید بهشتی بررسی و تأیید شد.

فرایند تحقیق

شرایط هایپوکسی با قرار دادن ماسک متصل به دستگاه هایپوکسی کاتور تکنفره روی صورت و تنظیم شرایط هایپوکسی توسط دستگاه کاتور با فشار اکسیژن ۱۳٪ / معادل ارتفاع ۴۰۰۰ متر از سطح دریا شبیه‌سازی شد. پروتکل تمرینات با شدت ۶۰ درصد یک تکرار بیشینه تا واماندگی، سه سمت با استراحت ۱ دقیقه به مدت ۴ هفته انجام گرفت (جدول ۱). برنامه تمرینی گروه نورموکسی نیز مانند گروه هایپوکسی بود، با این تفاوت که فعالیت آنها در شرایط اکسیژن طبیعی مشابه سطح دریا انجام گرفت. قبل از شروع جلسه تمرینی مرحله گرم کردن ۱۵ تکرار با ۵۰ درصد بیشینه ۱۰ تکرار انجام می‌گرفت.

عملکرد عضلانی: شامل اوج گشتاور مفصل آرنج، کل کار انجام گرفته توسط عضلات خم‌کننده آرنج، نسبت فعالیت عضلات موافق به مخالف و خستگی عضلانی است که بهوسیله دستگاه ایزوکینتیک (BIODEX-4, USA) اندازه‌گیری شد. آزمون شوندگان پس از گرم کردن مناسب مفصل آرنج دست راست، ابتدا پروتکل ۵ سمت با نهایت قدرت را برای اوج گشتاور مفصل آرنج و کل کار انجام گرفته توسط عضلات خم‌کننده آرنج را انجام دادند و پس از اتمام این پروتکل ۱۰ دقیقه استراحت کرده و پروتکل بعدی را برای تعیین نسبت فعالیت عضلات خم‌کننده به بازکننده‌ها آرنج اجرا کردند. این پروتکل شامل ۵ سمت ۵ تکراری از حرکت خم کردن و باز کردن آرنج بهصورت توانی بود. آزمودنی‌ها پس از هر سمت فعالیت توانی ۱ دقیقه استراحت غیرفعال را انجام می‌دادند. با اتمام ۳ سمت پروتکل توانی برای تعیین نسبت فعالیت عضلات موافق به مخالف آزمودنی‌ها مجدداً ۱۰ دقیقه استراحت کردن و پروتکل آخر را که شامل یک سمت ۲۵ تکراری برای تعیین شاخص خستگی بود، انجام دادند.

سطح مقطع عضله دوسر بازویی: چربی زیرپوستی دوسر بازویی آزمودنی‌ها با استفاده از کالیپر (هارپندن، BATY انگلستان) و حجم عضلات دوسر بازویی بهوسیله ارزیابی سطح مقطع عرضی عضله جلویازو با استفاده از متر نواری و کولیس اندازه‌گیری شد و با قرار دادن اعداد حاصله در فرمول بروش بررسی شد (۲۰، ۲۱). در نهایت وزن و قد نیز با استفاده از ترازوی دیجیتالی ایستاده سکا مدل ۷۶۹ دور بازو
بررسی شد.

$$ARM''CSA = \pi((\left(\frac{CA}{2\pi}\right) - \left(\frac{TA}{2}\right))^2 - 5.5)$$

چین پوستی بازو = CSA ، محیط دور بازو = TA

برای تعیین شدت آزمون از روش یک تکرار بیشینه با فرمول برزیسکی در شرایط هایپوکسی و نورموکسی استفاده شد. ورزشکاران وزنه پیش‌بین انتخاب و حرکت جلو بازو ایستاده هالت را اجرا کردند، سپس مقدار وزنه و تعداد تکرار ثبت و بیشینه یک تکرار مشخص شد. سپس ۶۰ درصد یک تکرار بیشینه محاسبه و به عنوان مقدار وزنه مدنظر برای هر شخص طی هر جلسه تعیین شد.

((۰۲۷۸ × تعداد تکرار تا خستگی) - (۱/۰۲۷۸)) / وزنه جابه‌جاشده = یک تکرار بیشینه
با توجه به ثابت بودن مقاومت و تعداد نوبت‌ها، حجم تمرین به وسیله فرمول زیر براساس تعداد تکرارها محاسبه شد (۳۲).

$$\text{وزنه} \times \text{تکرار} \times \text{نوبت} = \text{حجم تمرین}$$

تجزیه و تحلیل آماری

تمام محاسبات آماری توسط نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ انجام گرفت. توزیع طبیعی همه داده‌ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک تأیید شد ($P > 0.05$). از آزمون تی مستقل پس از کسر نمره‌های پس‌آزمون از پیش‌آزمون استفاده شد. توان آماری $P \leq 0.05$ برای ۱۶ آزمودنی به وسیله نرم‌افزار Gpower محاسبه شد.

یافته‌های تحقیق

نتایج تحقیق تفاوت معنادار را تنها برای شاخص خستگی و قدرت بیشینه در شرایط هایپوکسی در مقایسه با نورموکسی نشان داد ($P = 0.48$). درصد چربی دوسر بازویی، هایپرترووفی و سایر متغیرهای عملکرد عضلانی در بین دو گروه هایپوکسی و نورموکسی تفاوت چشمگیری را نشان ندادند ($P > 0.05$) (جدول ۱). حجم تمرین برای گروه هایپوکسی ۴۰۰/۲ تکرار و گروه نورموکسی ۴۰۸/۹ تکرار بود که نشان‌دهنده حجم کمتر معنادار تمرینات گروه هایپوکسی است ($P = 0.001$) (۸۷ تکرار).

جدول ۱. میانگین \pm انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق قبل و پس از ۴ هفته تمرین مقاومتی
هایپوکسی و نورموکسی

دو گروه		نورموکسی				هایپوکسی				گروه
معناداری	درصد تغییرات (%)	پیش آزمون	پس آزمون	درصد تغییرات (%)	پیش آزمون	پس آزمون	پیش آزمون	متغیر		
اوج گشتاور در انقباض درون گرا (نیوتن / متر)										
۰/۲۸۵	۳۰	۵۸/۹۵	۴۵/۲۱	۴۴	۶۳/۶۱	۴۴/۲۰	۴۴/۲۰	اوج گشتاور در انقباض درون گرا (نیوتن / متر)		
اوج گشتاور در انقباض برون گرا (نیوتن / متر)										
۰/۲۱۶	۱۵	۴۳/۵۳	۳۷/۷۸	۴۲	۴۷/۰۵	۳۳/۱۸	۳۳/۱۸	اوج گشتاور در انقباض برون گرا (نیوتن / متر)		
کل کار انجام گرفته در انقباض درون گرا (ژول)										
۰/۰۶۸	۱۳	۳۴۳/۶۶	۳۰۴/۶۰	۳۰	۳۷۷/۸۷	۲۹۰/۵۶	۲۹۰/۵۶	کل کار انجام گرفته در انقباض برون گرا (ژول)		
کل کار انجام گرفته در انقباض برون گرا (ژول)										
۰/۴۰۵	۱۳	۲۰۳/۹۸	۱۸۰/۴۸	۳۵	۲۱۲/۳۳	۱۵۷/۳۰	۱۵۷/۳۰	نسبت آگونیست به آنتاگونیست		
۰/۹۸	-۸	۱۳۱/۶۵	۱۴۲/۳۸	-۱	۱۴۷/۲۰	۱۴۸/۳۲	۱۴۸/۳۲	به آنتاگونیست		
۰/۰۴۸ *	-۲۷	۵۱/۷۰	۷۱/۲۰	-۲۲	۳۳/۱۳	۴۲/۶۳	۴۲/۶۳	شاخص خستگی		
۰/۹۹	۲۰	۴۷/۰۵	۳۹/۱۷	۱۹	۴۸/۳۵	۴۰/۶۶	۴۰/۶۶	حجم عضلانی (سانتی متر ^۳)		
۰/۰۶	۱۰	۴۳/۸۷	۴۰/۰۰	۵۶	۶۰/۲۵	۳۸/۷۸	۳۸/۷۸	قدرت عضلانی (کیلوگرم)		
۰/۱۱	-۴	۱۵/۳۲	۱۵/۹۵	-۸	۱۳/۵۶	۱۴/۷۴	۱۴/۷۴	درصد چربی دوسر بازوی		

* تفاوت معنادار در سطح $P \leq 0.05$

بحث

یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ۴ هفته تمرین مقاومتی جل بازو ایستاده هالت در شرایط هایپوکسی با بهبود شاخص خستگی و قدرت بیشینه همراه می‌شود، این در حالی است که شاخص‌های هایپرتروفی، گشتاور مفصل آرنج، کل کار انجام گرفته در عضله دوسر بازوی و نسبت قدرت عضلات موافق به عضلات مخالف آیزوکینتیک تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد. بهنظر می‌رسد نقش عواملی چون

شدت، مدت تمرین، زمان ریکاوری، وضعیت تمرین و نیز گروه عضلات درگیر در شرایط هایپوکسی در این زمینه اهمیت دارد (۲۳).

نتایج تحقیق حاضر موافق با نتایج تحقیق فریدمن و همکاران (۲۰۰۳) است که نشان داد ۴ هفته تمرینات مقاومتی کم شدت با تکرار بالا در شرایط هایپوکسی به افزایش معناداری در قدرت و هایپرترووفی نسبت به گروه نورموکسی منجر نمی شود (۲۴). اگرچه در پیشینه تحقیقات ۸ تا ۱۲ هفته تمرین مقاومتی منظم برای بروز سازگاری های تمرین مقاومتی نیاز است، با وجود این، نیشی مورا و همکاران (۲۰۱۰)، گزارش کردند که افزایش قدرت عضلانی به صورت معناداری پس از ۳ هفته تمرین مقاومتی در شرایط هایپوکسی رخ می دهد (۱۶). در تحقیق پان و همکاران (۲۰۱۶)، ۵ هفته تمرین مقاومتی هایپوکسی به ترشح بیشتر هورمون رشد و افزایش قدرت ایزومتریک منجر شد (۲۵). گازومیچی و همکاران (۲۰۱۵) و گواردادو و همکاران (۲۰۲۰)، نیز نتایج مشابه را گزارش کردند (۲۳، ۲۷). در تحقیق حاضر یک تکرار پیشینه آزمودنی ها در حرکت دوسر بازو هالترا در شرایط هایپوکسی افزایش معناداری را نسبت به نورموکسی نشان داد. با وجود این تغییرات هایپرترووفی بین دو گروه معنادار نبود. بهبود قدرت در ابتدا از طریق سازگاری های عصبی حاصل می شود که مستقل از تغییرات حجم عضله است (۲۶)، این در حالی است که بهبود هایپرترووفی به زمان بیشتری نیاز دارد. به نظر می رسد ۴ هفته پروتکل تمرینی در تحقیق حاضر برای القای قدرت مناسب است، زیرا سیستم انرژی فسفاتریک در این حالت تأمین کننده اصلی انرژی فعالیت است و می تواند طی این زمان بهبود یابد. با وجود این برای کسب سازگاری های هایپرترووفی سازگاری در ذخایر گلیکوژن و متabolیت ها عامل تعیین کننده ای است که به زمان بیشتری نیاز دارد (۲۶-۲۷). یافته دیگر تحقیق حاضر بهبود شاخص خستگی با تمرین مقاومتی در شرایط هایپوکسی بود. خستگی عضلانی که بیانگر میزان استقامت عضلانی است، در این تحقیق تغییرات معناداری را نشان داد. دلیل این تغییرات ممکن است اقتصاد فعالیت و سوخت و سازی باشد که بر اثر سازگاری با تمرین در شرایط هایپوکسی ایجاد می شود (۳۰). شدت مورد استفاده در تحقیق حاضر ۶۰ درصد پیشینه یک تکرار تا واماندگی بود که در محدوده تمرینات استقامت عضلانی قرار دارد و سبب افزایش استقامت و کاهش خستگی عضلانی می شود. در تحقیقات بسیاری شدت بالای تمرین مقاومتی بررسی شده که سازگاری های متفاوتی را نیز در پی داشته است (۳۱). با وجود این، آزمودنی های تحقیق حاضر را افراد سالم غیرورزشکار تشکیل می دادند که توانایی اجرای بار سنگین در شرایط هایپوکسی را نداشتند. گواردادو و همکاران (۲۰۲۰)، نشان دادند که انجام تمرین مقاومتی در شرایط هایپوکسی با بهبود اجرای عضله دوسر بازو

همراه می‌شود که همسو با نتیجه تحقیق حاضر است (۲۳). بهنظر می‌رسد سازگاری‌های انرژی و نیز بهبود ظرفیت تامپونی برای تداوم انقباض عضلانی در کسب نتیجه تحقیق حاضر مؤثر است. با توجه به تداوم انقباض عضله دوسر بازو تا واماندگی در تحقیق حاضر بهبود ظرفیت تامپونی و سازگاری‌های سوت‌وسازی در بهبود شاخص خستگی عضله دوسر بازو قابل تصور است، اگرچه این سازگاری‌ها در مطالعه حاضر بررسی نشد (۳۲).

دیگر نتیجه تحقیق حاضر، عدم تغییر معنادار عوامل عملکرد عضلانی مانند اوج گشتاور، کل کار انجام‌گرفته و نسبت فعالیت عضلات موافق به مخالف مفصل آرنج بود. اگرچه پیشینه تحقیقاتی زیادی برای متغیرهای عملکرد عضلانی آبزوکینتیک یافت نشد، این تغییرات با درنظر گرفتن حجم تمرين در گروه تحقیق قابل بررسی است. در تحقیق حاضر گروه هایپوکسی حجم تمرينی کمتری را در مقایسه با گروه نورموکسی تجربه کرد. بنابراین، تغییرات مشابه عملکرد عضلانی در گروه هایپوکسی و نورموکسی همراه با حجم تمرينی کمتر تمرين مقاومتی در گروه هایپوکسی نشان‌دهنده تأثیر بیشتر تمرين مقاومتی در شرایط هایپوکسی است.

با وجود نتایج تحقیق ارائه شده، تحقیق حاضر محدودیت‌هایی داشت که می‌تواند در تحقیقات آتی مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی هایپرتروفی با روش‌های دقیق‌تر اولتراسونیک، ارزیابی ظرفیت تامپونی و عوامل رشدی و نیز ذخایر موضعی عضلانی موضوعی است که در تحقیقات آینده می‌تواند مورد توجه محققان باشد.

نتیجه‌گیری

بهنظر می‌رسد سازگاری‌های مرتبط با تمرين مقاومتی در شرایط هایپوکسی به شدت، حجم و نوع پروتکل‌های استفاده شده و نیز آزمودنی‌های تحقیق سنتگی دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد در آزمودنی‌های غیرورزشکار سازگاری‌های تمرين مقاومتی حداقل در کوتاه‌مدت بیشتر قدرت عضلانی و شاخص خستگی را متأثر می‌کند. این در حالی است که با درنظر گرفتن حجم تمرين، تمرين مقاومتی در شرایط هایپوکسی مؤثرتر از تمرين مقاومتی در شرایط نورموکسی برای بهبود عملکرد عضلانی، قدرت و هایپرتروفی عضلانی است.

منابع و مآخذ

1. Ho J-Y, Kuo T-Y, Liu K-L, Dong X-Y, Tung K. Combining normobaric hypoxia with short-term resistance training has no additive beneficial effect on muscular performance and body composition. *The Journal of Strength & Conditioning Research.* 2014;28(4):935-41.
2. Fleck SJ, Kraemer WJ. Designing resistance training programs. *human kinetics.* Champaign, IL. 2004.
3. Kraemer WJ, Adams K, Cafarelli E, Dudley GA, Dooly C, Feigenbaum MS, et al. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. *Medicine and science in sports and exercise.* 2002;34(2):364-80.
4. McCall GE, Byrnes WC, Fleck SJ, Dickinson A, Kraemer WJ. Acute and chronic hormonal responses to resistance training designed to promote muscle hypertrophy. *Canadian Journal of applied physiology.* 1999;24(1):96-107.
5. Vo MAP. Maximal and submaximal exercise performance at altitude. 1998.
6. Gore CJ, Hahn AG, Aughey R, Martin DT, Ashenden M, Clark SA, et al. Live high: train low increases muscle buffer capacity and submaximal cycling efficiency. *Acta physiologica scandinavica.* 2001;173(3):275-86.
7. Katayama K, Sato K, Matsuo H, Ishida K, Iwasaki K-i, Miyamura M. Effect of intermittent hypoxia on oxygen uptake during submaximal exercise in endurance athletes. *European journal of applied physiology.* 2004;92(1-2):75-83.
8. Ramos-Campo DJ, Rubio-Arias JA, Dufour S, Chung L, Ávila-Gandía V, Alcaraz PE. Biochemical responses and physical performance during high-intensity resistance circuit training in hypoxia and normoxia. *European journal of applied physiology.* 2017;117(4):809-18.
9. Scott BR, Slattery KM, Sculley DV, Dascombe BJ. Hypoxia and resistance exercise: a comparison of localized and systemic methods. *Sports medicine.* 2014;44(8):1037-54.
10. Kraemer WJ, Häkkinen K, Newton RU, Nindl BC, Volek JS, McCormick M, et al. Effects of heavy-resistance training on hormonal response patterns in younger vs. older men. *Journal of applied physiology.* 1999;87(3):982-92.
11. Benso A, Broglio F, Aimaretti G, Lucatello B, Lanfranco F, Ghigo E, et al. Endocrine and metabolic responses to extreme altitude and physical exercise in climbers. *European Journal of Endocrinology.* 2007;157(6):733-40.
12. Goto K, Ishii N, Kizuka T, Takamatsu K. The impact of metabolic stress on hormonal responses and muscular adaptations. *Medicine and science in sports and exercise.* 2005;37(6):955-63.
13. Takarada Y, Takazawa H, Sato Y, Takebayashi S, Tanaka Y, Ishii N. Effects of resistance exercise combined with moderate vascular occlusion on muscular function in humans. *Journal of applied physiology.* 2000;88(6):2097-106.
14. Stewart C, Pell JM. Point: IGF is the major physiological regulator of muscle mass. *Journal of Applied Physiology.* 2010;108(6):1820-1.
15. Vingren JL, Kraemer WJ, Ratamess NA, Anderson JM, Volek JS, Maresh CM. Testosterone physiology in resistance exercise and training. *Sports medicine.* 2010;40(12):1037-53.

16. Nishimura A, Sugita M, Kato K, Fukuda A, Sudo A, Uchida A. Hypoxia increases muscle hypertrophy induced by resistance training. *International journal of sports physiology and performance.* 2010;5(4):497-508.
17. Kurobe K, Huang Z, Nishiwaki M, Yamamoto M, Kanehisa H, Ogita F. Effects of resistance training under hypoxic conditions on muscle hypertrophy and strength. *Clinical physiology and functional imaging.* 2015;35(3):197-202.
18. Manimmanakorn A, Hamlin MJ, Ross JJ, Taylor R, Manimmanakorn N. Effects of low-load resistance training combined with blood flow restriction or hypoxia on muscle function and performance in netball athletes. *Journal of Science and Medicine in Sport.* 2013;16(4):337-42.
19. Gibson AL, Wagner D, Heyward V. Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription, 8E: Human kinetics; 2018.
20. Heymsfield SB, McManus C, Smith J, Stevens V, Nixon DW. Anthropometric measurement of muscle mass: revised equations for calculating bone-free arm muscle area. *The American journal of clinical nutrition.* 1982;36(4):680-90.
21. Buresh R, Berg K, French J. The effect of resistive exercise rest interval on hormonal response, strength, and hypertrophy with training. *The Journal of Strength & Conditioning Research.* 2009;23(1):62-71.
22. Baechle TR, Earle RW. Essentials of strength training and conditioning: Human kinetics; 2008.
23. Guardado I, Ureña B, Cardenosa A, Cardenosa M, Camacho G, Andrada R. Effects of strength training under hypoxic conditions on muscle performance, body composition and haematological variables. *Biology of Sport.* 2020;37(1):121-9.
24. Friedmann B, Kinscherf R, Borisch S, Richter G, Bärtsch P, Billeter R. Effects of low-resistance/high-repetition strength training in hypoxia on muscle structure and gene expression. *Pflügers Archiv.* 2003;446(6):742-51.
25. Yan B, Lai X, Yi L, Wang Y, Hu Y. Effects of five-week resistance training in hypoxia on hormones and muscle strength. *The Journal of Strength & Conditioning Research.* 2016;30(1):184-93.
26. Siddique U, Rahman S, Frazer AK, Howatson G, Kidgell DJ. Determining the sites of neural adaptations to resistance training: a systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine.* 2019;1-25.
27. Kraemer WJ, Ratamess NA. Fundamentals of resistance training: progression and exercise prescription. *Medicine and science in sports and exercise.* 2004;36(4):674-88.
28. Newton R. Developing maximal neuromuscular power: part 2—training considerations for improving maximal power production. *Sports Med.* 2011;41(2):125-46.
29. Martínez-Guardado I, Camacho-Cardenosa M, Camacho-Cardenosa A, Olcina G, Timón R. Effect of strength training in hypoxia on body composition and muscle performance. *Motricidad.* 2017;13(1):135.

30. Brooks G, Butterfield G, Wolfe R, Groves B, Mazzeo R, Sutton J, et al. Increased dependence on blood glucose after acclimatization to 4,300 m. *Journal of applied physiology.* 1991;70(2):919-27.
31. Lasevicius T, Ugrinowitsch C, Schoenfeld BJ, Roschel H, Tavares LD, De Souza EO, et al. Effects of different intensities of resistance training with equated volume load on muscle strength and hypertrophy. *European journal of sport science.* 2018;18(6):772-80.
32. Edge J, Hill-Haas S, Goodman C, Bishop D. Effects of resistance training on H⁺ regulation, buffer capacity, and repeated sprints. *Medicine & Science in Sports & Exercise.* 2006;38(11):2004-11.

The Effect of 4 Weeks of Resistance Training in Hypoxic Conditions on Hypertrophy and Function of Biceps Muscle in Healthy Men

Ali Moghadasi¹- Mohammad Fashi^{*2}- Sajjad Ahmadizad³

1.MSc of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 2. Assistant Professor, Department of Biological Sciences in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 3. Professor, Department of Biological Sciences in Sport, Faculty of Sport Sciences and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

(Received: 2020/05/19; Accepted: 2020/09/08)

Abstract

Increased secretion of growth and metabolic factors by hypoxic exercise has been shown, while muscle function has not been considered as an effective factor in exercise performance. This study aimed to investigate the effect of 4 weeks of resistance training in hypoxic conditions on hypertrophy and function of biceps muscle in healthy men. 16 healthy young men were randomly assigned to two groups: hypoxic resistance training ($\text{PaO}_2=13\%$, $n=8$) and normoxic resistance training ($\text{PaO}_2=20\%$, $n=8$). The training program for both groups lasted 4 weeks including 3 sessions (60% of 1RM until exhaustion, 3 sets and 1 minute of rest) of standing curls biceps with 48 hours of recovery after the training per week. Strength was assessed by 1RM, hypertrophy by Buresh formula and muscle functions by the isokinetic system before and after 4 weeks of training. A comparison of the two groups showed statistically significant differences in strength and the fatigue index ($P\leq 0.05$). Other factors including biceps fat percentage, hypertrophy, elbow peak torque in concentric and eccentric contractions, total work of biceps in concentric and eccentric contractions and the ratio of agonist/antagonist muscle activity did not show significant differences ($P\geq 0.05$). It seems that 4 weeks of hypoxia resistance training is associated with a significant improvement in strength and fatigue index. However, hypertrophy and muscle function indices showed similar changes considering less training volume in hypoxia conditions.

Keywords

Hypertrophy, hypoxic conditions, muscle function, resistance training.

* .Corresponding Author : Email: M_fashi@sbu.ac.ir Tel: +9822431962